



- 1 Gerjesztőerő által keltett rezgés.
- 2 A hullámhossz lehet két szomszédos ... vagy ritkulás távolsága.
- 3 A rezgésszám mértékegysége kiírva.
- 4 2D-s hullámok másik elnevezése.
- 5 Az ilyen közegben terjedő zavart nevezünk hullámnak.
- 6 3D-s hullámok másik elnevezése.
- 7 Az anyag részecskéi a hullám terjedési irányára merőlegesen rezegnek.
- 8 Ezt a mozgást végzi egy kitérített és magára hagyott test.
- 9 Egyenesen arányos a megnyúlással, azzal ellentétes irányú és függ a rugóállandótól.
- 10 A gerjesztett rendszer visszahat a gerjesztőre.
- 11 Az a rezgés, melynél a magára hagyott rendszer energiája hővé alakul, miközben az amplitúdó csökken.
- 12 A hullám a rezgési energia ... tovaterjedése térben és időben.
- 13 A hullámhossz jele.
- 14 A legnagyobb amplitúdójú rezgés feltétele, hogy a kölcsönható testek között ez a jelenség lépjen fel.
- 15 Egy teljes hullám befutásához szükséges idő.
- 16 A részecskék rezgési sebessége és a hullám terjedési sebessége egymással párhuzamos.
- 17 Két szomszédos hullámhegy vagy hullámvölgy távolsága.
- 18 1D-s hullámok másik elnevezése.
- 19 Az időegység alatt megtett rezgések száma.
- 20 Megadja az egységnyi megnyúlás létrehozásához szükséges erőt. Mértékegysége N/m.
- 21 Maximális kitérés.
- 22 A közegellenállás mellett csökkentheti a rezgő rendszer amplitúdóját.